

外用合成副腎皮質荷爾蒙劑
妥膚淨[®] 乳膏

— 氟欣諾能 (Fluocinonide) 製劑 —

TOPSYM[®] CREAM

(衛署藥製字第 18063 號) ④


主成分 Fluocinonide 是外用專用副腎皮質荷爾蒙劑，具有卓越的抗炎症作用。妥膚淨乳膏是由高級脂肪族醇類與 Propylene glycol 配合為主體，以具有親水性基劑與油性基劑之中間性質的 FAPG 基劑所製成。對於濕潤性以及乾燥性部位之疾患，均適於使用。妥膚淨軟膏是使用白色 Vaseline 為基劑，對於乾燥性部位之疾患，尤其適合。

【成分】

一般名：Fluocinonide

化學名：6 α , 9 α , - Difluoro - 11 β , 21-dihydroxy - 16 α , 17 α - isopropylidenedioxy - 1, 4-pregnadiene - 3, 20 - dione - 21 - acetate.

化學構造式：



【劑型・組成】

妥膚淨乳膏：1g 中含有 Fluocinonide 0.5mg 的白色乳膏。

【賦形劑】

Propylene Glycol、Stearyl Alcohol、Macrogol 6000、1,2,6-Hexanetriol、Citric Acid

【適應症】

急性濕疹、慢性濕疹、乳・小兒濕疹、脂漏性濕疹、貨幣狀濕疹、接觸性皮炎、異位 (Atopy) 性皮炎、尋常性乾癬、圓形脫毛症、尋常性白斑、掌蹠膿疱症、癢疹類(蕁麻疹樣苔癬、粟粒疹或小丘疹、固定蕁麻疹)。

【用法・用量】

本藥須由醫師處方使用。通常一日 1 ~ 3 回適量塗布於患處。

【使用上的注意】

(1) 下述患者請勿投與之

1. 皮膚結核。
2. 單純性疱疹、水痘。
3. 無濕疹樣變化之白斑。

(2) 副作用

1. 皮膚：有時會出現化膿性感染症。若出現化膿性感染症時，請停止使用。
2. 過敏症：有時會出現皮膚刺激感等之過敏症狀。若出現此過敏症狀時，請停止使用。
3. 下垂體、副腎皮質系：長期、大量使用，或是以密封包帶法使用時，可能有抑制下垂體或副腎皮質係機能之作用。

(3) 妊婦的投與

妊婦投與的安全性尚未確定，因此對於妊婦或可能懷孕的婦人，應避免長期或大量廣範圍之使用。

(4) 使用上的注意

本劑不可以使用於眼科上。

【保管上的注意】

劇藥。請存放於陰涼處所。

【包裝】

妥膚淨乳膏：1000 公克以下軟管裝、瓶裝。



製造廠：台灣田邊製藥股份有限公司新竹廠

廠址：新竹縣湖口鄉光復北路 97 號

藥商：台灣田邊製藥股份有限公司

地址：台北市南港區市民大道七段 8 號 14 樓之 1

® : Registered Trademark of Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation