

# 膚潤康<sup>®</sup> 0.025% 益福軟膏

FLUCORT<sup>®</sup> F OINTMENT 0.025%  
フルコート<sup>®</sup> F 軟膏


(Neomycin 軟膏)  
(衛署藥製字第000605號)④

## 【成份】1g中含有下列成分的油性軟膏

Fluocinolone acetonide.....0.25mg

Neomycin sulfate.....3.5mg(力價)

- Fluocinolone acetonide在化學構造上具有2個氟，所以，使用在局部時，會發揮強力的消炎及抗過敏作用。
- Neomycin sulfate是對革蘭氏陽性、陰性菌、廣範圍的化膿菌，發揮強力殺菌作用的抗生素。



Fluocinolone acetonide

## 【賦形劑】

White Petrolatum、White Wax、Nikkol MYL-10、Propylene Glycol、Butyl-p-hydroxybenzoate

## 【膚潤康益福的特徵】

- Fluocinolone acetonide的消炎作用與Neomycin之殺菌力，會改善發炎性及細菌性皮膚病的症狀。
- 主成分Fluocinolone acetonide是專供外用的副腎皮質荷爾蒙。對於塗布或內服其他副腎皮質荷爾蒙不能充分發揮作用之情形，亦能期待其效果。
- 能消除化膿菌引起的皮膚糜濕和搔癢，可預防二次性感染。
- 為了避免塗藥部位之刺激，局部使用特殊的油性軟膏基劑。

## 【適應症】

急性・慢性濕疹、乳幼兒濕疹、異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎(斑疹)、過敏性皮膚炎、陰部及肛門搔癢症、蕁麻疹、昆蟲咬傷、膿痂疹、膿皮症(膿疱疔癰、疔、水泡疹、膿腫)、創傷(刀傷、擦傷)、火傷、凍傷。

【使用法】 本藥須由醫師處方使用。通常1日1~3次取適量塗布於患處。

## 【使用上的注意】

### (1)一般的注意

- 1.有時會出現皮膚過敏症狀，若出現此類症狀時，請停止使用。
- 2.避免長時間地使用於廣範圍的皮膚熱傷或潰瘍。

### (2)下列患者請勿使用

- 1.對Neomycin有抗藥性或對Neomycin為非敏感性菌體所引起的皮膚化膿性感染症。
- 2.皮膚結核。
- 3.單純性疱疹、種痘疹、水痘等濾過性皮膚疾患。
- 4.白癬症。
- 5.念珠菌(Candida)感染症。
- 6.對Neomycin.Kanamycin.Streptomycin.Dihydrostreptomycin.Gentamycin等Amino-糖系的生物質，以及對Bacitracin等有過敏症患者。

### (3)副作用

- 1.皮膚感染症：有時會出現對Neomycin有抗藥性或對Neomycin為非敏感性菌體所引起的皮膚膿性感染症、濾過性皮膚疾患、白癬症、Candida症等皮膚感染症。若有此現象時，請停止使用。
- 2.過敏症：發疹、刺激等皮膚過敏症狀出現時，請停止使用。
- 3.長期使用：有時會出現皮膚萎縮、脂肪組織萎縮、毛細血管擴張症等症狀，若有此異常現象時，請停止使用。
- 4.腦下垂體、副腎皮質系：長期、大量使用，或是以密封包帶法使用時，可能有抑制腦下垂體或副腎皮質系機能的作用。
- 5.其他：有時會有皮膚乾燥感、瘡癤樣發疹、汗疹、多毛症、色素消失、皮膚潰瘍等現象發生。

### (4)妊婦的投與：

妊婦投與的安全性尚未確定，因此對於妊婦或可能懷孕的婦人、應避免長期或大量廣範圍使用。

### (5)本劑不可使用於眼科上。

### (6)其他注意事項：

- 1.本劑使用後，未見症狀改善，或症狀惡化時，請停止使用。
- 2.本劑為皮膚疾患的治療藥，而不宜使用於化粧上或修鬚後，長期連續使用於臉部應注意。

【保管上的注意】 請存放於25°C以下陰涼處所。

【包裝】 100公克以下軟管裝、瓶裝。



製造廠：台灣田邊製藥股份有限公司新竹廠  
地址：新竹縣湖口鄉光復北路97號  
商：台灣田邊製藥股份有限公司  
地址：台北市南港區市民大道七段8號14樓之1